

Informacja dla mieszkańców województwa zachodniopomorskiego

Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Szczecinie informuje, że w dniach od 29 września do 02 października 2012 r., odbędzie się jesienne szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliznie. Podobnie jak w latach ubiegłych, szczepienie będzie wykonane poprzez wyrzucanie z samolotów na lasy, pola, łąki i nieużytki doustnej szczepionki zatopionej w przynęcie.


Jeżeli wystąpią niekorzystne warunki meteorologiczne lub inne przeszkody uniemożliwiające loty samolotów, akcja będzie prowadzona w kolejnych dniach października.

Apeluję o współpracę, by jesienna akcja szczepienia lisów zakończyła się sukcesem (tzn. by jak największa liczba dawek szczepionki została podjęta przez zwierzyne).

Proszę o kierowanie się niżej wymienionymi zasadami:

- 1) W trakcie rozrzucania szczepionki z samolotów i przez kolejne 7 dni po jej wyrzuceniu, czyli w dniach od 29 września do 09 października 2012 r., proszę:
 - nie urządzać polowań,
 - nie wprowadzać wycieczek, grup szkolnych oraz innych grup zorganizowanych na obszar objęty szczepieniem,
 - nie dotykać, nie zbierać i nie niszczyć przynęt zawierających szczepionkę,
 - zwierzęta gospodarskie trzymać pod kontrolą,
 - nie wypuszczać psów i kotów poza własne gospodarstwo bez nadzoru, bez uwięzi,
 - pouczyć dzieci, by unikały kontaktu ze szczepionką.
- 2) W razie kontaktu człowieka ze szczepionką należy niezwłocznie zgłosić się do najbliższej placówki służby zdrowia.
- 3) W przypadkach kontaktu zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić się do najbliższego zakładu leczniczego dla zwierząt.

Szczepionka w postaci zawiesiny z atenuowanym szczepem wirusa wścieklizny zawarta jest w blistrze zatopionym w przynęcie. Szczepionka w zanęcie kształtem zbliżona jest do nieregularnego



krażka o średnicach 3,5 i 4 centymetry, a wysokości 1,5 do 1,7 centymetra. Waga jednego krażka wynosi ok. 14 gram. Szczepionka przeznaczona jest do stosowania doustnego dla lisów wolno żyjących. Już jedna dawka szczepionki uodparnia lisa przeciwko wściekliznie wywoływanej przez szczepy uliczne wirusa oraz zapobiega przenoszeniu się choroby w środowisku. Szczepionka zapewnia ochronę wyłącznie lisom, które w momencie szczepienia nie były zakażone wirusem wścieklizny. Nie uodparnia zwierząt domowych.

Ze względu na to, że koty i psy są konkurentami w spożywaniu przynęt, należy trzymać je przy domu lub wyprowadzać na spacer w kagańcu i na smyczy. Szczepionka nie stanowi śmiertelnego zagrożenia dla innych gatunków zwierząt, co zostało potwierdzone badaniami. Jednakże każdorazową możliwość spożycia szczepionki przez zwierzę należy zgłosić w zakładzie leczniczym dla zwierząt.

Ze względu na konieczność zachowania swoistego zapachu przynęt, nęcącego dla lisów, zaleca się nie podnoszenie „krażków” szczepionki.

W przypadku dostania się płynnej szczepionki na błony śluzowe człowieka należy dokładnie przepłukać je wodą i bezzwłocznie zasięgnąć porady lekarza. W razie zetknięcia się szczepionki ze skórą narażone partie należy umyć wodą z mydłem. O fakcie jakiegokolwiek kontaktu szczepionki ze skórą, czy błonami śluzowymi człowieka należy również zawsze powiadomić lekarza pierwszego kontaktu.